



BISTIK

ufarlige stik — farlig allergi

Bodil Branner

Begynderkurset 2017

1. april 2017



- ◆ Når en bi stikker os, river den sig fri af brodden, som bliver siddende i stiksåret.
- ◆ Brodden fortsætter med at pumpe gift ind i såret. **Fjern brodden hurtigst muligt.**
- ◆ Bien dør.

- ◆ Hævelser - selv store hævelser - hvor man er stukket er IKKE farlige.
- ◆ Nældefeber - udslet på huden, der klør er IKKE farlige.

Alvorlig allergi



Symptomer:

- ◆ Store hævelser (> 10 cm) i diameter i mere end et døgn
- ◆ Utilpashed
- ◆ Kløe og rødmen på steder, hvor man ikke er stukket
- ◆ Svimmelhed, opkastning eller diarré
- ◆ Åndenød
- ◆ Blodtrykket falder, man besvimer
- ◆ Allergisk chock


Søg læge!

ca. 10 % af biavlere udvikler allergi



Forebyggelse og sikkerhed:

- ◆ Undlad at se til bier, når dårligt vejr er under vejs
- ◆ Beskyt dig, brug bidragt og handsker
- ◆ Hav rolige bevægelser, undlad at tirre eller klemme bierne
- ◆ Medbring anti-histaminer (f.eks. Alnok, fås i håndkøb)
- ◆ Medbring en tændt og opladt mobiltelefon
- ◆ Fortæl andre, at du ser til bier



Klinik for allergi

Gentofte Hospital
Niels Andersens Vej 65
2900 Hellerup

Klinik for allergi

I klinikken behandler vi allergi, efter henvisning fra egen læge. Klinikken er Region Hovedstadens eneste højt specialiserede allergiafdeling for voksne. Klinikken modtager henviste patienter over 6 år.



Allergivaccination:

- ◆ Et forløb på ca. 5 år
- ◆ 6 - 12 ugers optrapning (immunisering), 1 gang ugentlig
- ◆ 4 1/2 år vedligeholdelse (hver 8. uge)
- ◆ Livsvarig effekt
- ◆ Egen betaling
- ◆ Efter allergisk chok frarådes oftest at fortsætte biavl

Giftene fra bier og hvepse er forskellige

Så allergi over for bi- og hvepsestik er forskellige

Allergi over for f.eks. pollen og husstøvmider giver ikke større risiko for at få insektallergi.