

Myresyrebehandling til bekæmpelse af varroamider

Brug altid syrefaste handsker og beskyttelsesbriller, når du arbejder med myresyre, og hæld myresyre fra en beholder til en anden i det fri.

Myresyre anvendes kun efter den sidste høst af honning.

Det virker bedst, hvis udendørstemperaturen er mellem 15° og 20°.

Der er fem forskellige metoder:

- fri myresyre
- Nassenheider fordamper, hhv. klassisk og professionel
- Apidea fordamper
- Krämerplade

For småfamilier er metoden med fri myresyre at foretrække, da den nemt tilpasses familiens størrelse.

Fri myresyrebehandling med 60% myresyre

Ved fri myresyre bruges 2-3 ml. myresyre pr. tavle pr. gang:

2 ml. hvis myresyren doseres på sugende materiale over tavlerne,

3 ml. hvis myresyren doseres på sugende materiale i indskudsbakken.

Det sugende materiale kan f.eks. være en tør engangskarklud eller gulvpap.

Det anbefales at foretage behandlingen fire gange:

Fire på hinanden følgende dage;

alternativt fire gange hver anden dag eller hver tredje dag.

Fordelen ved alternativerne er, at myresyren doseres over hhv. 7 eller 10 dage.

Myresyreforbrug:

80 ml. over tavlerne, 120 ml. under tavlerne for en bifamilie på 10 tavler. Se også

<http://www.varroa.dk/varroa-viden/vejledninger/myresyre/>

Den klassiske Nassenheider fordamper med 60% myresyre

Fordamperen placeres op ad den forreste yngeltavle og bliver siddende i 7-10 dage.

Myresyreforbrug:

140 ml. myresyre og den store væge i en bifamilie på 10 tavler. Se også

<http://www.varroa.dk/varroa-viden/vejledninger/nassenheiderfordamperen/>

Metoden egner sig bedst til trugstade, da fordamperen fylder som en tavle.

Den professionelle Nassenheider fordamper med 60% myresyre

Fordamperen placeres over tavlerne på bærelisterne og bliver liggende i 12-14 dage. Der skal være et fordampningsrum over fordamperen. Der er ikke plads til den under et almindeligt låg. Et omvendt fodermagasin (uden metalindsats) kan bruges som fordampningsrum.

Myresyreforbrug:

Anbefaling: brug lille væge. Fyld flasken op med 60% myresyre, dvs. 250 ml. og lad den ligge 12 – 14 dage.

Apidea fordamper

Fordamperen indeholder en sugende klud. Følg brugsanvisningen på fordamperen.

Myresyreforbrug:

120 ml. til en bifamilie på 10 tavler.

Krämerplade

Man kan selv fremstille en Krämerplade eller købe den. Læs om brug på

<http://www.varroa.dk/varroa-viden/vejledninger/kramerplader/>